



Suivi Photographique des
Insectes Pollinisateurs

I) Qui ?



- **M**embres fondateurs



MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE



- **P**artenaires principaux



Fondation
Nature
& Découvertes

- **A**utres partenaires

- **P**artenaire technique



★ île de France

UPMC
PARIS UNIVERSITAS

arte



- Dans le cadre de...



... et des programmes de « sciences participatives » de Vigie-Nature

II) Quoi ?






SPIPOLL, un suivi des pollinisateurs et des floricoles



⇒ Vous avez dit pollinisation ?





III) Pourquoi ?



La pollinisation, un service écologique essentiel (Stabilité des écosystèmes et agrosystèmes)...

...mais menacé !

Une mortalité importante chez les abeilles domestiques
Et un déclin généralisé des pollinisateurs sauvages en GB, Pays Bas,
Allemagne... ⇒ France ?



IV) Comment ?

Pour un suivi efficace...

... Il faut :

- une bonne couverture spatiale
- des données sur l'ensemble des cortèges d'insectes pollinisateurs et floricoles




⇒ L'idée :

- recourir à la photographie numérique amateur
- dans le cadre d'un projet de « sciences participatives » !

Les sciences participatives

- Un triple objectif :
 - Rendre visible et lisible au grand public les concepts et les enjeux liés à l'érosion de la biodiversité
 - Sensibiliser le grand public à la démarche naturaliste en le rendant « acteur » d'un projet
 - Donner aux scientifiques et aux conservateurs des macro-tendances à différentes échelles

Le principe




Le Protocole

En résumé



Munissez-vous de votre appareil photo numérique et activez le mode macro 

- I) Choisissez un type de fleur
- II) Pendant 20 minutes minimum, prenez en photo tous les insectes venant s'y poser
- III) Triez et recadrez vos photos
- IV) Chargez-les sur www.spipoll.fr et identifiez les insectes à l'aide des clés à votre disposition sur le site



⇒ Le Protocole : Le but

Obtenir :

- une photo par « morpho-espèce » d'insecte
- de qualité suffisante pour certifier que le spécimen diffère des autres spécimens de votre collection

Liste (triée) des 28 critères d'identification accessibles:

Type végétatif

- ☒ Structures florales bien visibles et colorées
- ☒ Groupement des fleurs élémentaires en capitule ou non
- ☒ Type d'inflorescence
- ☒ Couleur principale des fleurs (ou inflorescences)
- ☒ Présence de sépales
- ☒ Vue d'ensemble
- ☒ Structure végétative
- ☒ La tige principale (son port) est

[Voir des ex. \(zoom\)](#)

Taxons éliminés

Voir les descriptions

Liste des 330 taxons candidats:

- Les Abricotiers, Pruniers et Amandiers (à fleurs blanches gé)
- Les Aconits bleus-violetés <des espèces du genre *Aconitum*>
- Les Aconits jaunes <des espèces du genre *Aconitum*>
- L'Actée en épi <*Actaea spicata* L.>
- L'Adonis de printemps <*Adonis vernalis* L.>
- L'Adonis des Pyrénées <*Adonis pyrenaica* DC.>
- Les Adonis rouges <des espèces du genre *Adonis*>
- Les Ails (à inflorescences blanches en ombelle lâche) <des
- Les Ails (à inflorescences blanches en tête) <des espèces d

Options

?

Critère d'identification: Type végétatif

Type végétatif

Plante herbacée

Plante ayant la consistance de l'herbe, par opposition aux plantes ligneuses (ayant la consistance du bois: arbres, arbustes ou arbrisseaux).



Ignorer

Arbrisseau

Plante ligneuse (ayant la consistance du bois), inférieure à 7m, se distinguant des arbres et arbustes par l'absence de tronc, se ramifiant dès la base et formant souvent un buisson.



Arbre ou arbuste

Plante ligneuse (ayant la consistance du bois) présentant un tronc.



⇒ Clé insectes

Accès direct aux ordres : Coléoptères

Identification Description Aide

Liste (triée) des 5 critères d'identification acc

- ✓ Période d'observation
- ✓ Positionnement géographique
- ☒ **Nature des ailes**
- Image du taxon
- Ordre

Taxons éliminés

Voir les descriptions

Liste des 499 taxons candidats:

- L'Acidalie double-ceinture «*Idaea aureolaria*»
- Les Agèles à motifs «plusieurs *Adelidae*»
- Les Agèles unies «plusieurs *Adelidae*»
- Les Agrestes «*Hipparchia* et autres»
- Les Alucitides «*Alucitidae*»
- L'Angéronie du Prunier (forme 1) «*Angerona*»
- L'Angéronie du Prunier (forme 2) «*Angerona*»
- L'Argus myope (mâle) «*Lycaena tityrus*»
- L'Arlesianette jaune «*Emmella trachealis*»

Critère d'identification: Nature des ailes

Ailes antérieures coriaces en partie ou totalement

Les ailes antérieures forment une carapace qui protège les ailes postérieures (non visibles au repos).



Ignorer

Ailes membraneuses opaques ou plumeuses

Ailes classiques de papillons.



Ailes membraneuses transparentes

Ailes transparentes, fumées, tachetées ou avec une brodure colorée.



Ailes absentes

Abeilles, bourdons et guêpes

Ce sont des insectes (6 pattes) qui font partie de l'ordre des Hyménoptères.
On compte environ 8 000 espèces en France.

⇒ Reconnaître une abeille

Les Hyménoptères ont 2 paires d'ailes membranées qui peuvent être jointes au repos (d'où leur nom, Hyménoptères signifiant "mariage" et "ailes") ce qui donne souvent l'impression que l'insecte n'a que 2 ailes au lieu de 4.



Les Hyménoptères ont des formes très variées : très colorés à entièrement noirs, allongés ou très trapus, très gros à très petits, très velus à glabres...

Quelques indices pour reconnaître un Hyménoptère :

✓ Les antennes

Bien visibles, le plus souvent filiformes et pointues contrairement aux mouches.

Abeilles



Mouches



✓ Les yeux

Yeux luisants en forme de goutte ou de haricot sur les côtés de la tête.

Abeilles



Mouches



Un exemple de collection, consultable sur www.spipoll.fr

2010-09-27

Aix-en-Provence, friche, 15 septembre 2010

AIX-EN-PROVENCE (13001), BOUCHES-DU-RHONE (13), PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (93)



AFFICHER

COSMOS BLANC

ENREGISTRER DANS MES COLLECTIONS PRÉFÉRÉES

PRÉCÉDENT

SUIVANT

RETOUR À LA LISTE



AFFICHER

13-11-2011

Nom de la Fleur: Taxon inconnu de la clé (cosmos sensation (asteraceae))

Il s'agit d'une fleur : plantée

Il s'agit d'un habitat : jardin privé, péri-urbain

par : cybelle

TOUTES SES COLLECTIONS DANS LES GALERIES

Localisation

LARON (64315), PYRENEES-ATLANTIQUES (64), AQUITAINE (72)



Dernière(s) identification(s):
Le Syrphé porte-plume <Sphaerophoria scripta>

AFFICHER



Dernière(s) identification(s):
Le Syrphé ceinturé <Epidyrus balteatus>

AFFICHER



Dernière(s) identification(s):
Les Eristales (autres) <Eristalis>

AFFICHER



Dernière(s) identification(s):
Les Eristales (autres) <Eristalis>

AFFICHER



Dernière(s) identification(s):
Les Bourdons fauves <Bombus>

AFFICHER



Dernière(s) identification(s):
Les Abeilles royales <Andrena et autres>

AFFICHER



Dernière(s) identification(s):
Le Vulcain <Vanessa atalanta>

AFFICHER


COMMENTAIRES DES INTERNAUTES

AJOUTER UN COMMENTAIRE

- par : Pricea 15-11-2011
Des fleurs en toutes saisons et un hôtel pour les insectes, c'est merveilleux et ça fait des collections de rêve ! Les photos sont superbes !
- par : Valie 15-11-2011
Vraiment magnifique !
- par : mclowenfr 15-11-2011
Très belles photos !
- par : sagittaire06 15-11-2011
Très belles photos, Cybelle, le Vulcain est magnifique.
- par : Beemlayoco 15-11-2011
Si belle collection de Cybelle !
- par : mathieuopie 15-11-2011

PRÉCÉDENT

RETOUR À LA COLLECTION →



IDENTIFICATION

Le Vulcain <Vanessa atalanta> par : cybelle 14-11-2011

Ancienne identification

PROPOSER UNE NOUVELLE IDENTIFICATION
ÉMETTRE UN DOUTE SUR L'IDENTIFICATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Date: 13-11-2011

Heure: 12:10 à 12:45

Ciel - couverture nuageuse: 0-25%

Température : 20-30°C

Vent: nul

Fleur à l'ombre : Non

COMMENTAIRES DES INTERNAUTES

Aucun commentaire enregistré.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

PRÉCÉDENT

SUIVANT

RETOUR À LA COLLECTION →



IDENTIFICATION

Les Cantharides <Cantharis> par : Prisca 15-11-2011

Cette personne a exprimé des doutes au sujet de cette identification.

J'ai exprimé un doute sur cette identification parce que...c'est un Téléphore fauve (partie foncée au bout des élytres)

Ancienne identification

15-11-2011 : Les Cantharides <Cantharis> par : sabdomi

PROPOSER UNE NOUVELLE IDENTIFICATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Date: 08-07-2011

Heure: 14:50 à 15:25

Ciel - couverture nuageuse: 0-25%

Température : 20-30°C

Vent: faible, irrégulier

Fleur à l'ombre : Non

IV) Quelques résultats





Participation...


Le réseau d'observateurs (novembre 2011)

- 6 900 inscrits
- (+) 4 000 inscrits à la newsletter
- 900 participants

- 5 300 collections
- 42 000 photos.

Où ont été faites les collections ?

Type d'occupation du sol où les 2235 collections de 2010 ont été effectuées



Les mois d'hiver 2010 ont été l'occasion pour les spécialistes de l'Opie de valider les données.

⇒ Les Spipolliens progressent !

	% de bonne identification	
	avant le 1er août 2010	après le 1er août 2010
Ensemble des insectes	59,7	69,4
Coléoptères	63,1	70,0
Diptères	65,4	76,0
Hyménoptères	54,7	64,5
Lépidoptères	73,7	79,8

	% de bonne identification
Ensemble des photos	65,2
Coléoptères	65,1
Diptères	72,5
Hyménoptères	60,2
Lépidoptères	77,4



Ce ne sont pas moins de 400 taxons qui ont été observés en 2010, dont **153 ne comprenant qu'une seule espèce**



Suivi Photographique des
Insectes Pollinisateurs