

Des lapins de garenne dans les grands parcs urbains de la Seine-Saint-Denis.


Par Léo Martin, Doctorant au MNHN



Rencontre naturaliste IDF 2017

Originalité de la thèse lapin/parc urbain en Seine-Saint-Denis

- Thèse interdisciplinaire à l'interface entre sciences sociales et sciences naturelles et en interaction avec les gestionnaires



La question de la cohabitation Humain/Faune sauvage




Point de friction entre Humain et Faune sauvage



Quelques généralités sur « l'origine » du lapin de garenne

- Le Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*) est originaire de la péninsule ibérique (Callou, 2003)
- Le genre *Oryctolagus* : Miocène (23Ma- 5Ma) dans sud de l'Espagne.
- *O. cuniculus* fut trouvé dans les formations du Pléistocène moyen (-781 000 et -126 000) en Espagne (Lopez-Martinez, 1977).
- En France: Pléistocène supérieur (Donard, 1982 ; Callou, 1995, 2003) (uniquement dans le sud)
- Le lapin « franchit » la Loire qu'à partir du 9^{ème} siècle (Callou, 1995, 2003) et sera largement diffusé au travers de l'Europe par la suite du fait de la multiplication des garennes.



Répartition actuelle du lapin (*Oryctolagus Cuniculus*) dans le monde


(d'après Flux & Fullagar 1992; 1994)

Extrait de l'ouvrage de Cécile Callou: « De la garenne au clapier étude archéozoologie du lapin en Europe occidentale » (2003)


Etat des connaissances pour la Seine-Saint-Denis

Les données archéozoologique pour la Seine-Saint-Denis:

Le lapin est recensé au Moyen-Age central (987 -1250) sur un site inventorié dans la commune de Saint-Denis (Morel, 1985).









LE BRACONNAGE EN FRANCE. — Panneuteur détruisant les lapins dans les bois de Montfermeil. (Croquis de M. Peulot.)

Le braconnage en France. « Panneuteur détruisant les lapins dans les bois de Montfermeil. » - Croquis de M. Peulot. - Illustration, 24,6 x 16,4. 1868. Archive départementale de Seine-Saint-Denis

Répartition de l'espèce *Oryctolagus cuniculus* par maille de 4 km² et par période



De Lacoste, N., Birard, J., Zucca, M. 2015.
Connaissances sur les mammifères non volants
en Région Île-de-France. Natureparif, Paris, 85p.



Répartition par période

- Inconnu
- Historique
- Avant 1984
- Entre 1984 et 2008
- Après 2008

Un statut paradoxal...voir complexe

- De gibier.... à nuisible... à quasi menacé (IUCN)

Cause du déclin:

Fragmentation des habitats

Le virus de la Myxomatose et le virus hémorragique (VHD)

A cela peut s'ajouter dans certains cas la surchasse.

Des cas de persistance locales: l'exemple du Sausset.



Des cas de persistance locales: l'exemple du Sausset.



Des cas de persistances locales: l'exemple du Sausset.





De la ville vers la campagne



TROP

VS



PAS ASSEZ

Un statut complexe qui rend la prise de décisions et l'arbitrage difficile pour les gestionnaires...

Le devenir des populations est complètement incertain ? Qui veut du lapin ?

Quelle « valeur écologique » attribuer aux populations dites « urbaines » ?

Quelle place souhaitons nous donner à ces espèces aux caractères plutôt « instables » ? La question de l'acceptable vs inacceptable ?