

DÉFI NATURE URBAINE 2026

Les vendredi 24 et samedi 25 avril 2026, habitants et naturalistes ont arpenté les espaces de nature d'Épinay-sur-Seine à la recherche des plantes, oiseaux, petites bêtes et champignons qui vivent à nos côtés.

En partenariat avec

L'INSTITUT
PARIS
REGION

ARB
AGENCE RÉGIONALE
DE LA BIODIVERSITÉ



QUELQUES CHIFFRES

pour dresser le bilan d'une journée réussie !

36 naturalistes

ont réalisé des inventaires

168 habitants

adultes, familles et enfants des centres de loisirs ont participé aux inventaires et ateliers

8 espaces de nature

ont fait l'objet d'inventaires : les Berges de Seine et leurs parcs, les jardins familiaux des Presles, la Réserve écologique et ses jardins familiaux et partagés, les parcs Berlioz et des Saules.

20 animations

et balades naturalistes ont été proposés pour faire découvrir la biodiversité urbaine aux habitants

584 espèces

ont été recensées, dont :


240 animaux différents (**202** insectes, **44** oiseaux, **50** arachnides, **14** gastéropodes...) **233** plantes et **5** champignons

dont **330**

nouvelles espèces découvertes sur la ville !

LES SITES INVENTORIÉS


par les naturalistes durant tout ou partie de la journée



LES DÉCOUVERTES

330 nouvelles espèces ont été découvertes sur la ville !
Découvrez à quels groupes d'espèces sont concernés par
ces nouvelles données :

Apport de l'inventaire éclair urbain
sur la richesse spécifique par groupe taxonomique




LES STARS DE LA JOURNÉE

Les espèces les plus observées par les naturalistes

LES ANIMAUX LES PLUS OBSERVÉS




L'anthophore à pattes plumeuses
Anthophora plumipes



Le tircis
Pararge aegeria



La fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla




Le lézard des murailles
Podarcis muralis



La mésange charbonnière
Parus major

LES PLANTES LES PLUS OBSERVÉES



La luzerne d'arabie
Medicago arabica



Le laiteron potager
Sonchus oleraceus



La véronique
Veronica persica



La pâquerette
Bellis perennis



Le trèfle des prés
Trifolium pratense



MERCI !

aux habitants, petits et grands, qui ont participé à la réussite de cette journée, aux naturalistes qui nous ont partagé leurs expertises et photographies, aux jardiniers et jardinières des jardins familiaux et partagés de la Réserve écologique et des Presles pour leur accueil chaleureux ainsi qu'à l'ARB pour l'organisation de cet évènement !





REMERCIEMENTS PARTICULIERS

à Pamela AMIARD, Lucien CLAIVAZ, Sylvie VAN DEN BRINK, Merlin HUMBERT, Robin MANEVY, Manon BERTON, Tancrède CHANNELIERE, Axel DEHALLEUX, de l'ANCA (Association des Naturalistes des Coteaux d'Avron) ; Gilles CARCASSES, Pierre DUHEM, Julien CARLIER, Juline LEQUEUX, Vincent BOYELLE, Stéphan CLOZEAU, Noah SALEME, Vincent VIGNON, Anne DELORME, Cyril EPICOCO, Gabriel FAGES, Frédéric JARRY, FURÉ Jamila, Laurent THIBEDORE, Catherine SU, Victor DUPUY, Anaïs BRUGIERE-GARDE, Caroline SART, François COUGOT DE LA RIBERE ; Hemminki JOHAN, Lucile DEWULF, Marc BARRA, Klaire HOUEIX, Gilles LECUIR, Gabrielle HUART, Marjorie MILLES et Ophélie RICCI de l'Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France, pour leur participation et leur aide dans l'organisation de l'évènement et l'analyse des données, leurs photographies précieuses et la saisie de leurs données sur les plateformes Géonature-îdF et iNaturalist.



LA BIODIVERSITÉ DES BERGES ET DES PARCS JEAN MONNET, DES BÉATUS ET LIHOUX

Une mosaïque de milieux favorisant une grande biodiversité

Le chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Cet oiseau aux plumes rouges et jaunes est un discret habitant des jardins. Son bec large et conique témoigne de son régime alimentaire granivore. Il doit en effet son nom aux graines de chardons dont il se régale ! Ainsi, il limite l'expansion de cette herbe indésirable qui pourrait gêner les cultures. Cet oiseau complètement protégé ne peut donc pas être capturé pour être enfermé en volière.



Le lézard des murailles

Podarcis muralis

Ce petit reptile a déjà été aperçu sur le chemin de Halage, dans les jardins et même sur la sente des Deux gares... On soupçonne donc qu'une population importante vit sur la ville, car le territoire du lézard est de 25 m². Sa durée de vie varie de 4 à 10 ans. Agile, il se faufile entre les trous des murs et les pierres chaudes sur lequel il vient se réchauffer : si la température dépasse 33°C il cherchera des zones d'ombre pour se rafraîchir. Il est principalement insectivore.





Couleuvre d'Esculape

Elaphe longissima

Cette couleuvre est observée depuis 2025 dans les haies des berges. Elle se nourrit principalement de petits mammifères notamment de rats, souris et campagnols. C'est un reptile qui n'est absolument pas venimeux, inoffensif et très craintif.



Le petit paon de nuit

Saturnia pavonia

Cet élégant papillon est une espèce commune des haies et lisières mais très rare dans des zones urbaines denses. Il est repérable grâce à ses belles ocelles, taches colorées ressemblant à des yeux, qui permettent d'effrayer ses éventuels prédateurs. Le mâle est reconnaissable à ses antennes en forme de peignes qui lui permettent de capter les phéromones de la femelle jusqu'à 2 kilomètres !



La sésie apiforme

Sesia apiformis

Ce papillon imite à la perfection une abeille ou une guêpe pour dissuader ses prédateurs. Ce type de mimétisme ou convergence se retrouvent chez beaucoup d'insectes qui sont les proies favorites des oiseaux.

Le caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

C'est une petite espèce de libellule que l'on appelle aussi demoiselle. Le mâle est reconnaissable à son corps bleu métallique et aux tâches fumées sur les ailes. Les caloptéryx vivent près des eaux courantes des rivières ou fleuves comme la Seine, à condition que les berges soient végétalisées.

En effet, les larves de libellules passent 1 à 2 ans sous l'eau avant de grimper sur une feuille immergée pour se métamorphoser en adulte ailé.



Notiophilus aestuans

Ce carabe noir apprécie particulièrement les prairies sèches et les friches. Qui saura l'observer de près pourra distinguer les magnifiques reflets dorés sur ses élytres, ses ailes rigides qui couvrent l'abdomen. Il se fait toutefois plutôt discret, peut-être pour ne pas se faire repérer par les hérissons qui ne seraient pas contre en faire leur en-cas nocturne...





Ischnodemus sabuleti

Cette punaise, qui dépend des milieux herbacés et humides, peuvent avoir plusieurs formes. Ici, c'est un individu dit « microptère » qui a été trouvé, c'est-à-dire que ses ailes raccourcies ne lui permettent pas de voler efficacement.

Si l'on trouve en majorité des individus microptères sur une zone donnée, cela pourrait signifier que le milieu est de bonne qualité écologique et qu'ils n'ont pas besoin de se disperser ailleurs pour s'épanouir.

Le charançon ovulé

Eusomus ovulum

Ce petit insecte à moustaches dépend des arbres comme les chênes et des plantes herbacées comme l'armoise commune et le trèfle pour se reproduire et se nourrir.





Le charançon du bouleau

Phyllobius betulinus

Reconnaissable à ses belles écailles vertes et à ses poils dorés visibles à la loupe, il se distingue aussi du charançon ovulé par sa préférence pour les feuilles de bouleau, qu'il consomme avec modération pour ne pas mettre en danger l'arbre. C'est une proie de choix pour les oiseaux et les chauves-souris et donc un maillon essentiel de la chaîne alimentaire et des écosystèmes.

Le puceron du peuplier

Chaitophorus populeti

Ce petit insecte a fait la joie et l'étonnement des naturalistes qui l'ont trouvé sur une pousse de peuplier alors qu'il n'avait jamais été vu dans la région. On distingue les adultes ailés des larves dépourvus d'ailes. On distingue en bas la fourmi qui fait élevage des larves de puceron pour se nourrir du miellat, substance sucrée qu'ils produisent à partir de la sève des plantes.

L'orchis pyramidal

Anacamptis pyramidalis

Cette orchidée protégée s'épanouit sur les prairies sur lesquelles les jardiniers pratiquent la fauche tardive, c'est-à-dire que l'herbe n'est pas coupée avant l'été ce qui permet à de nombreuses plantes de fleurir et de se reproduire. Elles sont également un excellent buffet pour toutes sortes d'insectes. Grâce à leur trompe, les papillons peuvent aspirer le nectar dissimulé au fond de ses fleurs.



Comprenez
sa stratégie de
pollinisation !



L'aristoloche clématite

Aristolochia clematitis

Cette plante typique des berges des cours d'eau est une « fausse plante carnivore ».

En effet, elle a développé une technique originale pour être pollinisée.

Ses pétales forment en effet un tube tapissé de poils et au fond duquel se trouvent les étamines portant le pollen. Les mouches attirées par l'odeur fétide de la fleur vont entrer à l'intérieur et se retrouver piégées par les poils. Ces derniers ne se décomposeront qu'une fois que l'insecte aura été jusqu'au fond de la fleur et sera couvert de pollen et pourra ainsi le disséminer !



La doradille noire

Asplenium adiantum-nigrum

Ces petites fougères poussent entre les pierres meulières, une belle surprise au vu de leur rareté sur le territoire. Elle témoigne de l'importance de conserver des murets en pierres, à la fois humides et chauds, favorables à de nombreuses plantes et animaux comme les lézards et de nombreux insectes.

Liste exhaustive des espèces rencontrées sur les Berges de Seine et dans les parcs lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Oiseaux (37 espèces)

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)
Corneille noire (*Corvus corone*)
Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
Foulque macroule (*Fulica atra*)
Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)
Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
Héron cendré (*Ardea cinerea*)
Martinet noir (*Apus apus*)
Merle noir (*Turdus merula*)
Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)
Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*)
Mésange charbonnière (*Parus major*)
Moineau domestique (*Passer domesticus*)
Mouette rieuse (*Chroicocephalus ridibundus*)
Perruche à collier (*Psittacula krameri*)
Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
Pic vert (*Picus viridis*)

Pie bavarde (*Pica pica*)
Pigeon biset (*Columba livia*)
Pigeon colombin (*Columba oenas*)
Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)
Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)
Serin cini (*Serinus serinus*)
Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)

Poissons

Gobie à tache noire (*Neogobius melanostomus*)
Brochet (*Esox lucius*)

Reptiles

Lézard des murailles (*Podarcis muralis*)

Mammifères

Hérisson d'Europe (*Erinaceus europaeus*)

Liste exhaustive des espèces rencontrées sur les Berges de Seine et dans les parcs

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Insectes (154 espèces)

Abeille charpentière (<i>Xylocopa violacea</i>)	Cétoine dorée (<i>Cetonia aurata</i>)	Corise de la jusquiame (<i>Corizus hyoscyami</i>)
Abeille domestique (<i>Apis mellifera</i>)	Cétoine punaise (<i>Valgus hemipterus</i>)	<i>Cryptomyzus ribis</i>
<i>Agonopterix purpurea</i>	<i>Chaitophorus populeti</i>	<i>Dasineura urticae</i>
Agrion élégant (<i>Ischnura elegans</i>)	Charançon à bandes blanches (<i>Nedyus quadrimaculatus</i>)	<i>Dicranotropis hamata</i>
Alternée (<i>Epirrhoe alternata</i>)	Charançon de l'Ortie (<i>Phyllobius pomaceus</i>)	<i>Dilophus</i> sp
Anaspe fauve (<i>Anaspis maculata</i>)	Charançon vert soyeux (<i>Polydrusus formosus</i>)	Disparate (<i>Lymantria dispar</i>)
<i>Andrena chrysosceles</i> (<i>Andrena chrysosceles</i>)	Charançons à étuis fauves (<i>Phyllobius oblongus</i>)	<i>Dyroderes umbraculatus</i>
<i>Andrena florea</i>	<i>Chelostoma florissomne</i>	Empis marqueté (<i>Empis tessellata</i>)
<i>Andrena gravida</i>	<i>Chloromyia formosa</i>	Eristale gluante (<i>Eristalis tenax</i>)
<i>Andrena nitida</i>	<i>Chrysolina oricalcia</i>	<i>Eristalis arbustorum</i>
<i>Andrena ranunculi</i> (<i>Andrena ranunculi</i>)	Chrysomèle du Romarin (<i>Chrysolina americana</i>)	<i>Eristalis similis</i>
<i>Andrena synadelpha</i> (<i>Andrena synadelpha</i>)	Chrysomèle populaire (<i>Chrysomela populi</i>)	<i>Eurydema ornata</i>
<i>Andrena vaga</i>	Chrysomèle versicolore du Saule (<i>Plagioderma versicolora</i>)	<i>Eusomus ovulum</i>
<i>Anthomyia procellaris</i>	Citron (<i>Gonepteryx rhamni</i>)	<i>Euura proxima</i>
<i>Anthophila</i> sp	<i>Closterotomus trivialis</i>	Flambé (<i>Ipheclides podalirius</i>)
Anthophore commune (<i>Anthophora plumipes</i>)	Coccinelle à 22 points (<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>)	Fourmi échancrée (<i>Lasius emarginatus</i>)
Anthrène des tapis (<i>Anthrenus verbasci</i>)	Coccinelle à 24 points (<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i>)	Galle lenticulaire du chêne (<i>Neuroterus quercusbaccarum</i>)
<i>Anthrenus angustefasciatus</i>	Coccinelle à 7 points (<i>Coccinella septempunctata</i>)	Gamma (<i>Autographa gamma</i>)
Aphrophore des saules (<i>Aphrophora salicina</i>)	Coccinelle à damier (<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>)	<i>Gastrallus laevigatus</i>
Aurore (<i>Anthocharis cardamines</i>)	Coccinelle à deux points (<i>Adalia bipunctata</i>)	Gendarme (<i>Pyrrhocoris apterus</i>)
Azuré des Nerpruns (<i>Celastrina argiolus</i>)	Coccinelle à dix points (<i>Adalia decempunctata</i>)	Géocore à tête rouge (<i>Geocoris erythrocephalus</i>)
Becmare puce (<i>Malvapion malvae</i>)	Coccinelle asiatique (<i>Harmonia axyridis</i>)	Grand bombyle (<i>Bombylius major</i>)
Bourdon des champs (<i>Bombus pascuorum</i>)	Coccinelle de la Bryone (<i>Henosepilachna argus</i>)	Grande coccinelle orange (<i>Halyzia sedecimguttata</i>)
<i>Bradybatus fallax</i>	Coccinelle des landes (<i>Chilocorus bipustulatus</i>)	Sauterelle verte (<i>Tettigonia viridissima</i>)
<i>Byturus ochraceus</i>	Coccinelle velue à bandes (<i>Scymnus interruptus</i>)	Grande Tortue (<i>Nymphalis polychloros</i>)
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	<i>Colletes cunicularius</i>	<i>Graphopsocus cruciatus</i>
Caloptéryx éclatant (<i>Calopteryx splendens</i>)	Collier-de-corail (<i>Aricia agestis</i>)	
<i>Capsus ater</i>		
Cardinal (<i>Pyrochroa coccinea</i>)		

Insectes

Guêpe germanique (*Vespula germanica*)
Halictus scabiosae
Hédobie impériale (*Ptinomorphus imperialis*)
Hespérie de l'Alcée (*Carcharodus alceae*)
Hétérogaster de l'ortie (*Heterogaster urticae*)
Hypocassida subferruginea
Isside commun (*Issus coleoptratus*)
Libellule déprimée (*Libellula depressa*)
Limonia nigropunctata
Louvette (*Korscheltellus lupulinus*)
Malachie à deux points
(*Malachius bipustulatus*)
Mélècte commune (*Melecta albifrons*)
Micromus variegatus
Minettia longipennis
Miris striatus
Mouche-à-scie à trois bandes jaunes
(*Macrophya montana*)
Mouche-à-scie cordelière (*Allantus cinctus*)
Mouche-à-scie porte-cœur
(*Tenthredopsis litterata*)
Muscina stabulans
Myathropa florea
Myopa sp
Nabide-fourmi (*Himacerus mirmicoides*)
Nemopoda nitidula
Némusien (*Lasiommata maera*)
Néphrotome de Pierre
(*Nephrotoma appendiculata*)

Nomada bifasciata
Nomada ruficornis
Osmie rousse (*Osmia bicornis*)
Pediaspis aceris
Penthimia nigra
Periphyllus testudinaceus
Petit Paon de Nuit (*Saturnia pavonia*)
Petite coccinelle orange (*Vibidia duodecimguttata*)
Phyllobius betulinus
Piéride de la Rave (*Pieris rapae*)
Piéride de l'Ibérider (*Pieris mannii*)
Piéride du Chou (*Pieris brassicae*)
Piéride du Lotier (*Leptidea sinapis*)
Piéride du Navet (*Pieris napi*)
Polydrusus inustus
Polyphaga sp
Psylle de l'arbre de Judée (*Cacopsylla pulchella*)
Puceron noir de la Luzerne (*Aphis craccivora*)
Puceron vert du rosier (*Macrosiphum rosae*)
Punaise arlequin (*Graphosoma italicum*)
Punaise arlequin (*Graphosoma italicum*)
Punaise verte à raies & rouges ou blanches (*Eurydema oleracea*)
Punaise verte ponctuée (*Nezara viridula*)
Pyrauste de la Menthe (*Pyrausta aurata*)
Pyrrhalta viburni
Rhagonycha nigriventris
Rhopalus subrufus
Rhynchite rouge du pommier (*Tatianaerhynchites aequatus*)
Robert-le-Diable (*Polygonia c-album*)

Sarcophaga
Sésie apiforme (*Sesia apiformis*)
Sphecodes albilabris
Stigmella aurella
Syrphe ceinturé (*Episyrphus balteatus*)
Téléphore de campagne
(*Cantharis rustica*)
Tenthredo temula
Tetraneura nigriabdominalis
Tettigometra impressopunctata
Thécla de l'Orme (*Satyrion w-album*)
Tingis auriculata
Tinodes waeneri
Tipule à bords des ailes bruns
(*Tipula oleracea*)
Tircis (*Pararge aegeria*)
Vrillette brune à bandes grises
(*Ochina ptinoides*)
Vulcain (*Vanessa atalanta*)
Yponomeuta sp.

Liste exhaustive des espèces rencontrées sur les Berges de Seine et dans les parcs

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Arachnides (34 espèces)

Acalitus brevitarsus
Aceria fraxinivora
Aceria macrorhyncha
Agélène à labyrinthe (Agelena labyrinthica)
Anelosimus vittatus
Anyphène à chevrons (Anyphaena accentuata)
Araneus sturmi
Araniella sp
Cheiracanthium mildei
Dictyna arundinacea
Dictyna uncinata
Dictyne fille (Nigma puella)
Diodie tête de mort (Zilla diodia)
Épeire à bosses (Gibbaranea bituberculata)
Épeire des roseaux (Larinioides cornutus)
Eratigena sp
Frontinellina frutetorum
Icius subinermis
Nigma flavescens
Oxyopes lineatus
Pardosa sp
Phalangium opilio
Philodromus albidus
Philodromus buxi
Philodromus rufus
Phytopte du tilleul (Eriophyes tiliae)
Pseudeuophrys erratica
Salticus zebraneus
Saltique arlequin (Salticus scenicus)

Saltique cuivré (Heliophanus cupreus)
Tetragnatha montana
Thomise Napoléon (Synema globosum)
Thomise rayé (Runcinia grammica)
Xystique (Xysticus)

Gastéropodes (13 espèces)

Bouton commun (Discus rotundatus)
Caragouille globuleuse (Cernuella virgata)
Cernuella sp
Clausilie commune (Clausilia bidentata)
Columelle obèse (Columella aspera)
Escargot des jardins (Cepaea hortensis)
Escargot petit-gris (Cornu aspersum)
Escargot turc (Helix lucorum)
Grand luisant (Oxychilus draparnaudi)
Hélicelle trompette (Helicella itala itala)
Maillot commun (Lauria cylindracea)
Vallonie costulée (Vallonia costata)
Veloutée commune (Trochulus hispidus)

Crustacés

Cloporte commun (Armadillidium vulgare)
Hyloniscus riparius
Platyarthrus hoffmannseggii
Trachelipus rathkii

Myriapode (mille-patte)

Polyxenus lagurus

Liste exhaustive des espèces rencontrées sur les Berges de Seine et dans les parcs

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Plantes à fleurs (472 espèces)

Achillée millefeuille (<i>Achillea millefolium</i>)	Céraiste aggloméré (<i>Cerastium glomeratum</i>)	Frêne à feuilles étroites (<i>Fraxinus angustifolia</i>)
Ail des vignes (<i>Allium vineale</i>)	Cerfeuil enivrant (<i>Chaerophyllum temulum</i>)	Frêne à fleur (<i>Fraxinus ornus</i>)
Ailante glanduleux (<i>Ailanthus altissima</i>)	Chardon crépu (<i>Carduus crispus</i>)	Frêne élevé (<i>Fraxinus excelsior</i>)
Alliaire (<i>Alliaria petiolata</i>)	Charme commun (<i>Carpinus betulus</i>)	Fumeterre grimpante (<i>Fumaria capreolata</i>)
Alpiste roseau (<i>Phalaris arundinacea</i>)	Chêne vert (<i>Quercus ilex</i>)	Fumeterre officinale (<i>Fumaria officinalis</i>)
Angélique sylvestre (<i>Angelica sylvestris</i>)	Chèvrefeuille du Japon (<i>Lonicera japonica</i>)	Fusain d'Europe (<i>Euonymus europaeus</i>)
Anthriscus sylvestre (<i>Anthriscus sylvestris</i>)	Chèvrefeuille très parfumé (<i>Lonicera fragrantissima</i>)	Gaillet à feuilles rondes (<i>Galium rotundifolium</i>)
Arbre à perruque (<i>Cotinus coggygria</i>)	Choisya terné (<i>Choisya ternata</i>)	Gaillet gratteron (<i>Galium aparine</i>)
Arbre de Judée (<i>Cercis siliquastrum</i>)	Cirse commun (<i>Cirsium vulgare</i>)	Géranium à feuilles rondes (<i>Geranium rotundifolium</i>)
Aristolochie clématite (<i>Aristolochia clematitis</i>)	Cirse des champs (<i>Cirsium arvense</i>)	Géranium découpé (<i>Geranium dissectum</i>)
Armoise commune (<i>Artemisia vulgaris</i>)	Clématite des haies (<i>Clematis vitalba</i>)	Géranium des Pyrénées (<i>Geranium pyrenaicum</i>)
Aubépine à un style (<i>Crataegus monogyna</i>)	Consoude officinale (<i>Symphytum officinale</i>)	Géranium fluet (<i>Geranium pusillum</i>)
Aubour faux ébénier (<i>Laburnum anagyroides</i>)	Coquelicot (<i>Papaver rhoeas</i>)	Géranium herbe-à-Robert (<i>Geranium robertianum</i>)
Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i>)	Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	Géranium mou (<i>Geranium molle</i>)
Benoîte des villes (<i>Geum urbanum</i>)	Cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>)	Gesse sylvestre (<i>Lathyrus sylvestris</i>)
Berce sphondyle (<i>Heracleum sphondylium</i>)	Cornouiller soyeux (<i>Cornus sericea</i>)	Gléchome lierre terrestre (<i>Glechoma hederacea</i>)
Bident feuillé (<i>Bidens frondosa</i>)	Cotonéaster (<i>Cotoneaster</i>)	Gouet d'Italie (<i>Arum italicum</i>)
Bourrache officinale (<i>Borago officinalis</i>)	Dactyle aggloméré (<i>Dactylis glomerata</i>)	Grande bardane (<i>Arctium lappa</i>)
Brachypode des forêts (<i>Brachypodium sylvaticum</i>)	Ellébore d'Orient (<i>Helleborus orientalis</i>)	Grande chélidoine (<i>Chelidonium majus</i>)
Brome stérile (<i>Anisantha sterilis</i>)	Épipactide hellébore (<i>Epipactis helleborine</i>)	Groseillier rouge (<i>Ribes rubrum</i>)
Brome stérile (<i>Bromus sterilis</i>)	Érable champêtre (<i>Acer campestre</i>)	Hémérocalle lys-asphodèle (<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>)
Bryone dioïque (<i>Bryonia dioica</i>)	Érable negundo (<i>Acer negundo</i>)	Herbe Catois (<i>Prunella vulgaris</i>)
Buddleia de David (<i>Buddleja davidii</i>)	Érable plane (<i>Acer platanoides</i>)	Hêtre des forêts (<i>Fagus sylvatica</i>)
Capselle bourse-à-pasteur (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	Érable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	Himantoglosse bouc (<i>Himantoglossum hircinum</i>)
Cardamine des prés (<i>Cardamine pratensis</i>)	Érodium à feuilles de ciguë (<i>Erodium cicutarium</i>)	Houblon lupulin (<i>Humulus lupulus</i>)
Cardamine hérissée (<i>Cardamine hirsuta</i>)	Érodium musqué (<i>Erodium moschatum</i>)	Houx commun (<i>Ilex aquifolium</i>)
Carotte sauvage (<i>Daucus carota</i>)	Eupatoire chanvrine (<i>Eupatorium cannabinum</i>)	Iris faux acore (<i>Iris pseudacorus</i>)
	Euphorbe péplus (<i>Euphorbia peplus</i>)	Ivraie (<i>Lolium</i>)
	Ficaire printanière (<i>Ficaria verna</i>)	Jacobée commune (<i>Jacobaea vulgaris</i>)
	Figuier d'Europe (<i>Ficus carica</i>)	

Plantes à fleurs

Koelreutéria paniculé (*Koelreuteria paniculata*)
Laîche à épis pendants (*Carex pendula*)
Laîche des rives (*Carex riparia*)
Laîche écartée (*Carex divulsa*)
Laîche espacée (*Carex remota*)
Laîche hérissée (*Carex hirta*)
Laiteron des champs (*Sonchus arvensis*)
Laiteron épineux (*Sonchus asper*)
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus*)
Laitue cultivée (*Lactuca sativa*)
Laitue scariote (*Lactuca serriola*)
Laitue vireuse (*Lactuca virosa*)
Lamier pourpre (*Lamium purpureum*)
Lierre grimpant (*Hedera helix*)
Liseron des haies (*Convolvulus sepium*)
Lunaire annuelle (*Lunaria annua*)
Luzerne cultivée (*Medicago sativa*)
Luzerne d'Arabie (*Medicago arabica*)
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina*)
Lycopée d'Europe (*Lycopus europaeus*)
Mahonia à feuilles de houx (*Berberis aquifolium*)
Marronnier (*Aesculus*)
Marronnier d'Inde (*Aesculus hippocastanum*)
Mauve négligée (*Malva neglecta*)
Mauve sylvestre (*Malva sylvestris*)
Mélilot blanc (*Melilotus albus*)
Mélisse officinale (*Melissa officinalis*)
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum*)
Morelle douce-amère (*Solanum dulcamara*)

Myriophylle en épi (*Myriophyllum spicatum*)
Nandine domestique (*Nandina domestica*)
Nigelle de Damas (*Nigella damascena*)
Noisetier commun (*Corylus avellana*)
Orchis pyramidal (*Anacamptis pyramidalis*)
Orge sauvage (*Hordeum murinum*)
Orme mineur (*Ulmus minor*)
Ortie dioïque (*Urtica dioica*)
Pâquerette vivace (*Bellis perennis*)
Pariétaire de Judée (*Parietaria judaica*)
Passerage drave (*Lepidium draba*)
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius*)
Pâturin annuel (*Poa annua*)
Pâturin commun (*Poa trivialis*)
Pâturin des prés (*Poa pratensis*)
Pavot d'Orient (*Papaver orientale*)
Pervenche élevée (*Vinca major*)
Petite bardane (*Arctium minus*)
Peuplier blanc (*Populus alba* var. *pyramidalis*)
Phacélie à feuilles de tanaïsie (*Phacelia tanacetifolia*)
Phragmite austral (*Phragmites australis*)
Picride fausse épervière (*Picris hieracioides*)
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale*)
Pissenlit (*Taraxacum*)
Plantain élevé (*Plantago major*)
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*)
Platane (*Platanus*)
Platane d'Orient (*Platanus orientalis*)

Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata*)
Potentille rampante (*Potentilla reptans*)
Prunier domestique (*Prunus domestica*)
Prunier du Portugal (*Prunus lusitanica*)
Prunier laurier-cerise (*Prunus laurocerasus*)
Prunier merisier (*Prunus avium*)
Pyracantha écarlate (*Pyracantha coccinea*)
Raifort rustique (*Armoracia rusticana*)
Renoncule âcre (*Ranunculus acris* subsp. *acris*)
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus*)
Renoncule rampante (*Ranunculus repens*)
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare*)
Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*)
Ronce bleue (*Rubus caesius*)
Ronce ligneuse (*Rubus fruticosus*)
Rose trémière (*Alcea rosea*)
Rosier (*Rosa*)
Salicaire commune (*Lythrum salicaria*)
Saponaire officinale (*Saponaria officinalis*)
Sauge à petites feuilles (*Salvia microphylla*)
Saule gris cendré foncé (*Salix atrocinerea*)
Saule blanc (*Salix alba*)
Silène à feuilles larges (*Silene latifolia*)
Sisymbre officinal (*Sisymbrium officinale*)
Stellaire intermédiaire (*Stellaria media*)

Plantes à fleurs

Sureau noir (*Sambucus nigra*)
Symphorine blanche (*Symphoricarpos albus*)
Tanaisie commune (*Tanacetum vulgare*)
Toona de Chine (*Toona sinensis*)
Trèfle des prés (*Trifolium pratense*)
Trèfle oseille à fleurs jaunes (*Oxalis corniculata*)
Trèfle rampant (*Trifolium repens*)
Troène à feuilles ovales (*Ligustrum ovalifolium*)
Troène commun (*Ligustrum vulgare*)
Tulipier de Virginie (*Liriodendron tulipifera*)
Valérianelle potagère (*Valerianella locusta*)
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia*)
Véronique à feuilles de serpolet (*Veronica serpyllifolia*)
Véronique à feuilles presque lobées (*Veronica sublobata*)
Véronique de Perse (*Veronica persica*)
Véronique des champs (*Veronica arvensis*)
Véronique petit-chêne (*Veronica chamaedrys*)
Vesce cracca (*Vicia cracca*)
Vesce cultivée (*Vicia sativa*)
Violette odorante (*Viola odorata*)
Viorne (*Viburnum*)
Viorne obier (*Viburnum opulus*)
Viorne tin (*Viburnum tinus*)

Gymnosperme

Ginkgo biloba

Prétidophytes (fougères et prêles)

Doradille noire (*Asplenium adiantum-nigrum*)
Doradille rue-des-murailles (*Asplenium ruta-muraria*)
Doradille scolopendre (*Asplenium scolopendrium*)
Prêle des champs (*Equisetum arvense*)

Hépatique

Lunularia cruciata

Lichen

Xanthoria parietina
Punctelia borreri
Flavoparmelia soledians
Candelaria concolor
Punctelia subrudecta
Parmotrema perlatus
Physcia adscendens
Lecanora rupicola
Lecanora muralis
Lecanora albescens
Lecidella elaeochroma

A person with dark hair, wearing a black t-shirt and dark trousers, is seen from behind, walking through a field of tall, dry grass and green wildflowers. They are carrying a large black backpack with a silver water bottle visible in a side pocket. The background is filled with lush green trees and a clear blue sky with some light clouds. An orange rounded rectangle is overlaid on the center of the image, containing white text.

LA BIODIVERSITÉ DE LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE


Des jardins cultivés à la friche herbacée en passant par les prairies :
un vrai sanctuaire pour la faune et la flore !

L'écureuil roux

Sciurus vulgaris

Ce petit mammifère a besoin de plusieurs hectares arborés pour se déplacer d'une branche à l'autre en restant à l'abri des prédateurs. Assez craintif, il peut toutefois se laisser observer s'il est occupé à manger noix et noisettes !



A photograph of two long-tailed tits (Aegithalos caudatus) perched on thin, light-colored branches. The birds are facing each other, with their long, dark tails extending downwards. They have white chests, dark heads with a white stripe through the eye, and brownish wings. The background is a soft-focus green, suggesting foliage.

La mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Aussi appelé orite, cet oiseau est très social : il se déplace en groupe familial de 3 à 20 individus. Elle construit son petit nid à l'aide de mousses, plumes, lichens.

Écoutez son chant !



Le pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Aussi appelé chiff-chaff ou compteur d'écu, ce petit oiseau jaune au plumage jaune clair construit son nid à même le sol. Alors pour éviter d'être dérangé par les chats ou les plus gros oiseaux, il choisira bien volontiers un gros massif de ronces ou de buissons épineux !

La fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Les mâles, identifiables à leur calotte noire sur la tête, sont de très bons chanteurs ! Les femelles quant à elles ont des plumes brunes à rousses du sommet de la tête. Le couple fabrique son nid dans les buissons vers la fin du mois d'avril : tailler ses haies à cette période peut mettre gravement en péril la vie des poussins !



La poule

Gallus gallus domesticus

Saviez-vous qu'il y a un poulailler pédagogique dans la ville ? L'association du jardin partagé « Les Gens du Jardin » s'occupe chaque jour des poules et du lapin qui y vivent, ainsi que d'un grand potager partagé. Car la biodiversité ce n'est pas seulement les animaux et plantes sauvages mais également la grande diversité des espèce cultivées !

L'éristale des fleurs

Myathropa florea

Mais quel est cette drôle abeille aux gros yeux et aux antennes si courtes qu'on ne les voit même pas sur la photo ? Ce n'est justement pas une abeille mais bien une mouche déguisée en abeille ! Aussi appelées syrphes, ces farceuses sont mimétiques et évitent ainsi de se faire dévorer !



Le tircis

Pararge aegeria

Ce papillon présente 6 ocelles noirs à tâches blanches sur la face supérieure des ailes. Il est souvent présent dans les lisières et les zones boisées car il préfère la mi-ombre au soleil. Les femelles pondent leurs œufs sur des graminées.



La sylvaine

Ochlodes sylvanus

Ce discret papillon est reconnaissable à sa couleur brun-rousse, à la forme de la massue au bout de ses antennes ainsi qu'à ses ailes qui ne sont jamais rabattue sur un même plan.





La coccinelle arlequin

Harmonia axyridis

Cette coccinelle, dont on voit ici la larve, est une grande vorace car elle se nourrit d'énormément de pucerons chaque jour (jusqu'à plusieurs centaines !). C'est pour cette raison qu'elle a été amenée en France depuis l'Asie au début des années 2000. Elle va bientôt se métamorphoser et prendre la forme que l'on connaît plus communément.

L'oedemère vert

Oedemera nobilis

Cet insecte métallique fait partie de la famille des coléoptères. Il affectionne particulièrement les herbes hautes et les fleurs car les adultes se nourrissent de pollen tandis que les larves mangent des bois et branches. Ici il s'agit d'un mâle, reconnaissable à ses fémurs élargis.



La grande sauterelle verte

Tettigonia viridissima

La grande sauterelle verte est le plus grand orthoptère que l'on peut trouver dans les jardins et l'un des plus communs. Ici, il s'agit d'un jeune qui n'a pas encore déployé ses ailes.

Elle aime particulièrement se cacher dans les buissons de ronces. Contrairement à une idée reçue, elle ne consomme pas en majorité les fruits ni légumes du jardin mais préfère les mouches, chenilles et autres larves d'insectes, c'est donc plutôt une alliée qu'une ennemie du jardinier !





La lithobie

Lithobius forficatus

Ce mille-patte (comptez les pour vérifier !) vit à l'abri de la lumière, sous un tas de feuilles mortes ou de bois en décomposition. Elle se nourrit de nombreuses petites bêtes croisées sur son chemin à la tombée de la nuit. Elle se fera un plaisir de dévorer pucerons, fourmis, chenilles ou araignées !



La ronce

Rubus fruticosus

Plante épineuse et vigoureuse, la ronce s'installe sur les terrains où les jardiniers interviennent peu... Mais pourquoi devrions-nous la laisser pousser sur des parcelles choisies ? Car elle fait le bonheur des insectes pollinisateurs (ici du bourdon terrestre et de l'abeille mellifère), et des gourmands avec ses mûres délicieuses en été !

La renoncule à petites fleurs

Ranunculus parviflorus

Bonne nouvelle : cette plante qui fut autrefois en danger d'extinction et donc protégée voit aujourd'hui ses populations augmenter ! Elle semble apprécier les milieux urbains et en particulier les prairies sur terrains sablonneux qui peuvent s'assécher en été mais être très humides en automne.



Liste exhaustive des espèces rencontrées à la Réserve écologique

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Insectes (73 espèces)

Abeille charpentière (*Xylocopa violacea*)
Abeille domestique (*Apis mellifera*)
Andrena haemorrhoa
Anthonomus rubi
Anthophila fabriciana
Anthophore commune (*Anthophora plumipes*)
Antripe minime (*Anthribus nebulosus*)
Austrolimnophila latistyla
Azuré des Nerpruns (*Celastrina argiolus*)
Bourdon des champs (*Bombus pascuorum*)
Bourdon des prés (*Bombus pratorum*)
Calliphora vicina
Chrysomèle du Romarin (*Chrysolina americana*)
Coccinelle à damier
(*Propylea quatuordecimpunctata*)
Coccinelle arlequin (*Harmonia axyridis*)
Corée marginée (*Coreus marginatus*)
Corizus hyoscyami hyoscyami
Cycliste maillot-vert (*Oedemera nobilis*)
Cynips quercusfolii
Dasytes croceipes
Decticelle cendrée (*Pholidoptera griseoaptera*)
Disparate (*Lymantria dispar*)
Ectopsocus briggisi
Ectopsocus petersi
Empis marqueté (*Empis tessellata*)
Epistrophe eligans
Eristalis similis
Eurydema ornata

Eurydema ventralis
Flambé (*Iphiclydes podalirius*)
Fourmi échancrée (*Lasius emarginatus*)
Fourmi mineuse (*Formica cunicularia*)
Fourmi noire des jardins (*Lasius niger*)
Fourmi quadripunctuée
(*Dolichoderus quadripunctatus*)
Galle lenticulaire du chêne
(*Neuroterus quercusbaccarum*)
Gamma (*Polygona c-album*)
Gothique (*Orthosia gothica*)
Grammoptera sp
Ischnodemus sabuleti
Isside commun (*Issus coleoptratus*)
Lepturette rousse (*Grammoptera ruficornis*)
Leskia aurea
Lucilia sp
Mégachile du rosier (*Megachile centuncularis*)
Minettia longipennis
Myathropa florea
Nabis rugosus
Nephrotoma quadrifaria
Néphrotome de Pierre (*Nephrotoma appendiculata*)
Orthosie du Cerisier (*Orthosia cerasi*)
Osmie rousse (*Osmia bicornis*)
Otites jucunda
Penthimia nigra
Periphyllus sp
Péritèle gris (*Peritelus sphaeroides*)

Petite nymphe au corps de feu
(*Pyrrhosoma nymphula*)
Phyllobius pyri
Piéride de l'Ibérie (*Pieris mannii*)
Poisson d'argent (*Lepisma saccharina*)
Puceron vert du rosier
(*Macrosiphum rosae*)
Punaise verte (*Palomena prasina*)
Pyrrhalta viburni
Rhopalus subrufus
Rhyparochromus vulgaris
Rhyzobius chrysomeloides
Scathophaga lutaria
Sphaerophoria scripta
Stenodema laevigata
Stephanitis pyri
Stethorus pusillus
Syrphus sp
Tipula vernalis
Tircis (*Pararge aegeria*)

Liste exhaustive des espèces rencontrées à la Réserve écologique

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Arachnides (27 espèces)

Aceria fraxinivora
Aceria macrorhyncha
Anelosimus vittatus
Anystis sp
Carrhotus xanthogramma
Cheiracanthium
Clubiona comta
Diodie tête de mort (Zilla diodia)
Dipoena melanogaster
Épeire à bosses (Gibbaranea bituberculata)
Épeires concombres (Araniella cucurbitina)
Evarcha arcuata
Heliophanus sp
Macaroeris nidicolens
Mangore petite-bouteille (Mangora acalypha)
Oxyopes lineatus
Pardosa lugubris
Pardose forestière (Pardosa saltans)
Philodromus rufus
Phytote du tilleul (Eriophyes tiliae)
Pisaure admirable (Pisaura mirabilis)
Saltique cuivré (Heliophanus cupreus)
Steatoda nobilis
Theridion varians
Thomise Napoléon (Synema globosum)
Trachyzelotes pedestris
Zoropse à pattes épineuses (Zoropsis spinimana)

Escargots

Bulime boueux (Merdigera obscura)
Clausilie commune (Clausilia bidentata bidentata)
Escargot des haies (Cepaea nemoralis)
Escargot petit-gris (Cornu aspersum)
Hélice carénée (Hygromia cinctella)

Crustacés

Armadillidium nasatum
Cloporte commun (Oniscus asellus)
Philoscie des mousses (Philoscia muscorum)
Porcellio scaber
Porcellio spinicornis
Trichoniscus sp

Collemboles

Deuterosminthurus pallipes
Entomobrya muscorum

Liste exhaustive des espèces rencontrées à la Réserve écologique

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Oiseaux (26 espèces)

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*), en vol
Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*), en vol
Choucas des tours (*Coloeus monedula*)
Corneille noire (*Corvus corone*)
Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*), en vol
Étourneau roselin (*Pastor roseus*)
Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
Goéland leucophée (*Larus michahellis*)
Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)
Martinet noir (*Apus apus*)
Merle noir (*Turdus merula*)
Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus caudatus*)
Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)
Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*)
Mésange charbonnière (*Parus major*)
Moineau domestique (*Passer domesticus*)
Perruche à collier (*Psittacula krameri*)
Pic épeiche (*Dendrocopos major*)
Pie bavarde (*Pica pica*)
Pigeon ramier (*Columba palumbus*)
Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)
Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)
Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)



Liste exhaustive des espèces rencontrées à la Réserve écologique

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Plantes (139 espèces)

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*)
Ailante glanduleux (*Ailanthus altissima*)
Alchémille (*Alchemilla* sp.)
Alliaire (*Alliaria petiolata*)
Anthriscus commun (*Anthriscus caucalis*)
Armoise (*Artemisia verlotiorum*)
Armoise commune (*Artemisia vulgaris*)
Barbarée commune (*Barbarea vulgaris*)
Benoîte des villes (*Geum urbanum*)
Bourrache officinale (*Borago officinalis*)
Brome stérile (*Anisantha sterilis*)
Bryone dioïque (*Bryonia dioica*)
Buddleia de David (*Buddleja davidii*)
Capselle bourse-à-pasteur
(*Capsella bursa-pastoris*)
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta*)
Carotte sauvage (*Daucus carota*)
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum*)
Céraiste des sources (*Cerastium fontanum*)
Cerfeuil enivrant (*Chaerophyllum temulum*)
Charme commun (*Carpinus betulus*)
Chèvrefeuille à cupule (*Lonicera pileata*)
Cirse commun (*Cirsium vulgare*)
Cirse des champs (*Cirsium arvense*)
Clématite des haies (*Clematis vitalba*)
Consoude officinale (*Symphytum officinale*)
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata*)
Égopode podagraire (*Aegopodium podagraria*)

Épine-vinette (*Mahonia* sp.)
Érable champêtre (*Acer campestre*)
Érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*)
Érodium à feuilles de cigüe (*Erodium cicutarium*)
Euphorbe péplus (*Euphorbia peplus*)
Fausse arabette de Thalius (*Arabidopsis thaliana*)
Ficaire printanière (*Ficaria verna*)
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca*)
Frêne élevé (*Fraxinus excelsior*)
Gaillet à feuilles rondes (*Galium rotundifolium*)
Gaillet gratteron (*Galium aparine*)
Géranium à feuilles rondes
(*Geranium rotundifolium*)
Géranium découpé (*Geranium dissectum*)
Géranium herbe-à-Robert (*Geranium robertianum*)
Géranium mou (*Geranium molle*)
Gesse à feuilles larges (*Lathyrus latifolius*)
Gléchome lierre terrestre (*Glechoma hederacea*)
Gouet d'Italie (*Arum italicum*)
Grande chélidoine (*Chelidonium majus*)
Groseillier rouge (*Ribes rubrum*)
Houblon lupulin (*Humulus lupulus*)
Houlque laineuse (*Holcus lanatus*)
Iris faux acore (*Iris pseudacorus*)
Iris fétide (*Iris foetidissima*)
Laîche à épis pendants (*Carex pendula*)
Laîche des marais (*Carex acutiformis*)
Laîche des rives (*Carex riparia*)
Laîche écartée (*Carex divulsa*)

Laîche glauque (*Carex flacca*)
Laiteron épineux (*Sonchus asper*)
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus*)
Laitue scariote (*Lactuca serriola*)
Laitue vireuse (*Lactuca virosa*)
Lamier blanc (*Lamium album*)
Lamier pourpre (*Lamium purpureum*)
Lampsane commune (*Lapsana communis*)
Laurier noble (*Laurus nobilis*)
Lierre grimpant (*Hedera helix*)
Lilas commun (*Syringa vulgaris*)
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis*)
Liseron des haies (*Convolvulus sepium*)
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus*)
Luzerne cultivée (*Medicago sativa*)
Luzerne d'Arabie (*Medicago arabica*)
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina*)
Luzerne naine (*Medicago minima*)
Mahonia à feuilles de houx
(*Berberis aquifolium*)
Matricaire camomille (*Matricaria chamomilla*)
Mauve négligée (*Malva neglecta*)
Mauve sylvestre (*Malva sylvestris*)
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum*)
Noisetier commun (*Corylus avellana*)
Noyer royal (*Juglans regia*)
Orge sauvage (*Hordeum murinum*)
Ortie dioïque (*Urtica dioica*)
Oxalide de Dillenius (*Oxalis dillenii*)
Pâquerette vivace (*Bellis perennis*)

Liste exhaustive des espèces rencontrées à la Réserve écologique

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 (toute la journée)

Plantes

Passerage drave (*Lepidium draba*)
Patience oseille (*Rumex acetosa*)
Pâturin annuel (*Poa annua*)
Pâturin commun (*Poa trivialis*)
Pâturin des prés (*Poa pratensis*)
Petite bardane (*Arctium minus*)
Phragmite austral (*Phragmites australis*)
Picride fausse épervière (*Picris hieracioides*)
Picride fausse vipérine (*Helminthotheca echioides*)
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale*)
Plantain élevé (*Plantago major* subsp. *major*)
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*)
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata*)
Potentille des Indes (*Potentilla indica*)
Potentille rampante (*Potentilla reptans*)
Potérium sanguisorbe (*Poterium sanguisorba*)
Primevère commune (*Primula vulgaris*)
Prunier domestique (*Prunus domestica*)
Prunier du Portugal (*Prunus lusitanica*)
Prunier merisier (*Prunus avium*)
Pyracantha écarlate (*Pyracantha coccinea*)
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus*)
Renoncule rampante (*Ranunculus repens*)
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare*)
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*)
Ronce bleue (*Rubus caesius*)
Ronce ligneuse (*Rubus fruticosus*)
Rosier des chiens (*Rosa canina*)
Saponaire officinale (*Saponaria officinalis*)

Schédonore roseau (*Schedonorus arundinaceus*)
Séneçon commun (*Senecio vulgaris*)
Silène à feuilles larges (*Silene latifolia*)
Silène commun (*Silene vulgaris*)
Solidage (*Solidago* sp.)
Sureau noir (*Sambucus nigra*)
Tanaïsie commune (*Tanacetum vulgare*)
Torilide noueuse (*Torilis nodosa*)
Trèfle des prés (*Trifolium pratense*)
Trèfle rampant (*Trifolium repens*)
Tussilage pas-d'âne (*Tussilago farfara*)
Valérianelle potagère (*Valerianella locusta*)
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia*)
Véronique à feuilles presque lobées (*Veronica sublobata*)
Véronique de Perse (*Veronica persica*)
Véronique des champs (*Veronica arvensis*)
Vesce cultivée (*Vicia sativa*)
Vesce des moissons (*Vicia segetalis*)
Vesce hérissée (*Vicia hirsuta*)
Vigne-vierge commune (*Parthenocissus inserta*)
Violette de Rivinus (*Viola riviniana*)
Viorne lantane (*Viburnum lantana*)

Champignons

Cloque du pêcheur (*Taphrina deformans*)
Phragmidium mucronatum

Lichens

Lichen encroûtant jaune (*Xanthoria parietina*)
Phaeophyscia orbicularis

LA BIODIVERSITÉ DES JARDINS FAMILIAUX DES PRESLES

L'art de faire rimer agriculture et nature en ville !





Le Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Habitant discret du vieux bâti agricole ou urbain, ce petit oiseau aime se percher sur les toits, câbles et antennes satellites pour chanter. Il se nourrit d'insectes et notamment de larves comme les chenilles. Il récolte herbes sèches et mousses pour construire son nid : s'il en est satisfait il reviendra nicher au même endroit chaque année ! En hiver, certains migrent autour de la Méditerranée, d'autres s'adaptent et passent l'hiver en Île-de-France.



Ecoutez son cri !



Le Martinet noir

Apus apus

Cet oiseau que l'on pourrait confondre avec une hirondelle a la particularité de ne jamais se poser : il mange, se reproduit et dort même en volant au dessus des nuages ! Pour trouver l'énergie nécessaire au vol, il capture de nombreux insectes volants dont les pucerons et les moustiques, c'est donc un excellent allié !



Madame martinet ne se posera qu'une fois dans l'année pour pondre ses œufs. Ses petits grandissent dans un nid posé dans les cavités des bâtiments et des toitures. La rénovation des maisons et immeubles à la mauvaise période et sans prévoir des nichoirs peuvent leur être fatale. En Île-de-France, c'est une espèce menacée.




L'étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Facilement identifiable à son plumage tacheté de blanc et à son bec jaune (qui devient noir en hiver !), l'étourneau est un oiseau très social. Les familles se regroupent en été dans des perchoirs qui peuvent comporter plusieurs milliers d'individus.

C'est un très bon imitateur, il peut reproduire les jappements du chien, les caquètements de la poule ou encore les bêlements de moutons qui seraient à proximité.

Il est aussi un excellent auxiliaire au jardin puisqu'ils consomment nombres de taupins, chenilles, limaces et petits escargots. Il apprécie aussi vers de terre et cloporte et donc préfèrent les jardins pleins de vie !





Le pigeon ramier

Columba palumbus

Aussi appelés « palombes », ces pigeons se distinguent de leurs cousins les pigeons bisets par une tache blanche à l'arrière du cou, un bec orangé et une couleur grisâtre tirant sur le violet, assez uniforme.

Le pigeon ramier est plutôt granivore et préfère se percher dans les arbres plutôt que sur les façades des immeubles pour créer son nid auquel il restera fidèle, comme à sa compagne, toute sa vie !



Le moineau domestique

Passer domesticus

Facilement reconnaissable à son bavoir noir, son bec épais de granivore et sa calotte grise au printemps au sommet de la tête, le moineau domestique et son gazouillis sont bien connus et pourtant ses populations connaissent un fort déclin. En effet, il manque d'insectes pour nourrir les poussins, en raison de la disparition des prairies et l'utilisation d'insecticides. Les haies ou les cavités dans les vieux bâtiments, très utiles à la construction des nids, viennent également à manquer. Planter des arbustes et installer des nichoirs les aideraient donc beaucoup !



La merlette

Turdus merula

Contrairement à son compagnon le merle noir qui a des plumes noires, un bec jaune et une auréole jaune autour de l'œil, Dame Merlette est entièrement brune.

Discrète, elle bâti un nid de branchages et de terre au milieu des feuilles d'arbres ou du lierre. Ses baies lui offrent d'ailleurs un excellent repas tout au long de l'hiver durant lequel ses mets préférés, vers de terre et chenilles viennent à manquer.

Le sphinx colibri

Macroglossum stellaratum

Ce papillon aussi appelé « moro-sphinx » est très reconnaissable à son vol stationnaire : il peut faire jusqu'à 75 battements d'ailes par secondes pour rester devant sa fleur et aspirer un maximum de nectar ! Il utilise pour cela sa trompe qui mesure jusqu'à 3 centimètre soit pratiquement la même taille de son corps.



Le némusien

Lasiommata maera

Mimétique des rochers et copeaux, on le voit souvent posé sur les chemins caillouteux et les murs des jardins.

Ses ocelles, points noirs et blancs sur ses faces supérieures et inférieures de ses ailes, imitent des yeux pour décourager ses prédateurs.

Identifiez
sa chenille !



Le xylocope violet

Xylocopa violacea

Avec sa taille supérieure à 3 centimètres, c'est l'une des plus grandes et bruyantes abeilles sauvages de nos régions ! On la surnomme aussi « abeille charpentière » car elle creuse dans le bois pour construire le nid où naîtront ses petits.

Observe-la creuser son nid !



Grande gourmande en nectar, elle a une préférence pour les fleurs de la famille des Lamiacées (menthe, origan, romarin, sauge...) qu'elle participe donc à polliniser !

La cétoine dorée

Cetonia aurata

Ce petit scarabée aux teintes vertes métalliques se retrouve en général sur les fleurs de la famille des rosiers ou du persil. On trouve ses larves dans la terre ou le compost où elles peuvent être confondues avec celles du hanneton. On la voit parfois avec des grains de pollen collés à la tête ou au thorax, c'est bien un animal pollinisateur !

Apprenez à reconnaître
sa larve !



La chrysomèle du romarin

Chrysolina americana

Ce petit coléoptère qui ressemble à une coccinelle est reconnaissable à ses reflets métalliques et ses rayures rouge et vertes. On le retrouve cachées sur les feuilles des plantes de la famille du romarin, de la lavande... Même si beaucoup l'accuse de se nourrir des feuilles au point d'abîmer les arbustes, nous constatons au jardin que les deux vivent bien côte à côte.



Araignée-lynx à rayures

Oxyopes lineatus

Cette araignée ne tisse pas de toile ! Elle chasse à vue ses proies dans les buissons et a pour cela une excellente vision, d'où son nom.

Identifiez
sa chenille !



Polyxenus lagurus

Cet animal discret de la famille des mille-pattes mesure 3 mm et vit sous les feuilles mortes, dans les cavités des vieux murs ou sous l'écorce des arbres, où il se cache de ses prédateurs que sont les fourmis et les araignées. Il se nourrit d'algues ou de lichen.

Observez-le en
mouvement !



A photograph of four snails on green leaves. Two snails in the foreground are facing each other, while two others are in the background, slightly out of focus. The snails have brown and white striped shells and dark, wrinkled bodies with long eye stalks. The leaves are large and green with serrated edges.

Le petit-gris

Helix aspersa aspersa

Cet escargot très commun dans les jardins possède comme ses cousins les mollusques marins des tentacules rétractiles sur sa tête, dont deux grandes portent ses yeux. Il repère ainsi les plantes à plus de 100 mètres de distance ! Alors pour l'attirer en dehors de vos parcelles, n'hésitez pas à placer en bordure hosta, tournesols et zinnia dont il fera un festin.

Liste exhaustive des espèces rencontrées aux jardins familiaux des Presles lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 matin (1h sur place)

Oiseaux

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
Martinet noir (en vol) (*Apus apus*)
Merle noir (*Turdus merula*)
Moineau domestique (*Passer domesticus*)
Pie bavarde (*Pica pica*)
Pigeon biset (*Columba palumbus*)
Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Arachnides

Araignée-lynx à rayures (*Oxyopes lineatus*)
Épeire de Sturm (*Araneus sturmi*)
Trachyzelotes pedestris

Crustacé terrestre (« cloporte »)

Aselle des murs (*Oniscus asellus*)
Armadillidium nasatum
Porcellio scaber
Philoscia muscorum

Mollusques

Escargot petit-gris (*Cornu aspersum*)
Escargot turc (*Helix lucorum*)

Myriapodes (« milles-pattes »)

Polyxenus lagurus

Insectes (18 espèces)

Abeille charpentière (*Xylocopa violacea*)
Abeille domestique (*Apis mellifera*)
Anthophore commune (*Anthophora plumipes*)
Cétoine dorée (*Cetonia aurata*)
Chrysomèle du Romarin (*Chrysolina americana*)
Coccinelle à deux points (*Adalia bipunctata*)
Coccinelle arlequin (*Harmonia axyridis*)
Fourmi échancrée (*Lasius emarginatus*)
Fourmi mineuse (*Formica cunicularia*)
Isside commun (*Issus coleoptratus*)
Moro-Sphinx (*Macroglossum stellatarum*)
Némusien (*Lasiommata maera*)
Néphrotome de Pierre (*Nephrotoma appendiculata*)
Piéride de la Rave (*Pieris rapae*)
Planuncus vinzi
Puceron vert du rosier (*Macrosiphum rosae*)
Punaise verte ponctuée (*Nezara viridula*)
Tircis (*Pararge aegeria*)

Collembole

Xenylla sp

LES DRÔLES DE BÊTES DES PARCS BERLIOZ, DES SAULES ET DE LA CHEVRETTE



Le sureau noir

Sambucus nigra

Ce petit arbre aux fleurs blanches odorantes a le double avantage de nourrir les pollinisateurs assez tôt au printemps et de ravir nos palais puisqu'on utilise ses fleurs pour fabriquer des sirops et infusions. Attention toutefois à ne pas le confondre avec le sureau hièble, qui ne fait pas de bois.





Le lierre terrestre

Glechoma hederacea


Cette cousine de la menthe pousse généralement au pied des haies à la mi-ombre. Elle est très aromatique et peut donc être utilisée pour agrémenter des salades et des jus, en prenant bien soin de la laver convenablement la plante pour la désinfecter et de ne pas la cueillir là où il y a beaucoup de passages d'animaux.

L'achillée millefeuille

Achillea millefolium

Cette petite plante pousse volontiers sur les gazons, elle supporte assez bien la tonte et le piétinement et a l'avantage de résister à la sécheresse et offre donc du nectar et du pollen aux insectes même en période très chaude. L'achillée fait partie de la même famille que la carotte ou le persil, que l'on appelle Ombellifère en raison de la disposition des fleurs en forme d'ombrelle.



A photograph of a brown butterfly with yellow spots resting on a large green nettle leaf. The background is filled with other green foliage and some small purple flowers.

L'ortie dioïque

Urtica dioica

Quelle drôle d'idée de laisser pousser cette plante urticante dans les parcs et des jardins des villes ! Il y a bien une raison à cela : l'ortie est en effet essentielle à la survie des papillons, des coccinelles et de plein d'autres insectes dont elle est l'unique « plante-hôte » ! En plus, l'ortie cueillie jeune est délicieuse en tisane ou en soupe. Si vous avez été piqué, pas d'inquiétude, il suffit de repérer le plantain, une plante qui pousse généralement proche de l'ortie et qui permet d'apaiser ses brûlures.

Le geai des chênes

Garrulus glandarius

Cet élégant oiseau au plumage coloré est un véritable ingénieur de la forêt ! Son gros bec lui permet de consommer toute sorte de fruit, notamment les glands, châtaigne et noix. Il sème 5 000 glands par an ! Lorsqu'il fait ses réserves, il cache ces fruits et l'étourdi quand il a en oublié permet à de nouveaux petits arbres de germer ! Alors, merci le geai !



Le pic vert

Picus veridis

Cet animal emblématique des massifs arborés perfore le tronc des arbres pour faire son nid dans une cavité. Après son départ, il permet à d'autres oiseaux comme les mésanges de nidifier !



La mésange huppée

Lophophanes cristatus

La huppe sur sa tête la distingue de toutes les autres mésanges. Cette discrète habitante des jardins préfère surtout se balader sur les conifères et consomme principalement des araignées et autres insectes.



L'anthophore à pattes plumeuses

Anthophora plumipes

Cette discrète petite abeille creuse son nid dans les talus ensoleillés, dans les sols argileux, ou dans les murs de terre et de pierres.



Liste exhaustive des espèces rencontrées aux parc Berlioz, de la Chevrette et des Saules lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 après-midi (1h sur place)

Insectes (36 espèces)

Andrena cineraria
Andrena haemorrhoa
Andrena ranunculi
Anthophore commune (*Anthophora plumipes*)
Azuré de la Bugrane (*Polyommatus icarus*)
Azuré des Nerpruns (*Celastrina argiolus*)
Bombyx de la Ronce (*Macrothylacia rubi*)
Bourdon des champs (*Bombus pascuorum*)
Brun du pélargonium (*Cacyreus marshalli*)
Chelostoma florissomme
Coccinelle à damier (*Propylea quatuordecimpunctata*)
Coccinelle à deux points (*Adalia bipunctata*)
Coccinelle arlequin (*Harmonia axyridis*)
Collier-de-corail (*Aricia agestis*)
Cuivré commun (*Lycaena phlaeas*)
Eurydema ventralis
Flambé (*Iphiclides podalirius*)
Fourmi quadripunctuée (*Dolichoderus quadripunctatus*)
Galéruque bleue (*Agelastica alni*)
Grand bombyle (*Bombylius major*)
Grande Tortue (*Nymphalis polychloros*)
Halictus scabiosae
Lasius brunneus
Machaon (*Papilio machaon*)
Mégère (*Lasiommata megera*)
Mouche-à-scie cordelière (*Emphytus cinctus*)
Mouche-à-scie porte-cœur (*Tenthredopsis litterata*)

Osmie rousse (*Osmia bicornis*)
Piéride de la Rave (*Pieris rapae*)
Poecilus cupreus
Punaise nébuleuse (*Rhaphigaster nebulosa*)
Syrphe ceinturé (*Episyrphus balteatus*)
Tircis (*Pararge aegeria*)
Vulcain (*Vanessa atalanta*)

Escargot

Bulime boueux (*Merdigera obscura*)

Arachnides

Anelosimus sp
Carrhotus xanthogramma
Diodie tête de mort (*Zilla diodia*)
Dysdera crocata
Épeire de velours (*Agalenatea redii*)
Frontinellina frutetorum
Harpactée pattes-rayées (*Harpactea hombergi*)
Mangore petite-bouteille (*Mangora acalypha*)
Nelima doriae
Pseudeuophrys erratica

Crustacés terrestres (cloportes)

Haplophthalmus danicus
Platyarthrus hoffmannseggii

Liste exhaustive des espèces rencontrées aux parc Berlioz, de la Chevrette et des Saules

lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 après-midi

Plantes (58 espèces)

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*)
Ail des vignes (*Allium vineale*)
Anthriscus sylvestre (*Anthriscus sylvestris*)
Benoîte des villes (*Geum urbanum*)
Berce sphondyle (*Heracleum sphondylium*)
Brome mou (*Bromus hordeaceus*)
Brome stérile (*Anisantha sterilis*)
Brome stérile (*Anisantha sterilis*)
Cirse commun (*Cirsium vulgare*)
Clématite des haies (*Clematis vitalba*)
Copalme d'Amérique (*Liquidambar styraciflua*)
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata*)
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata*)
Ficaire printanière (*Ficaria verna*)
Frêne élevé (*Fraxinus excelsior*)
Fromental élevé (*Arrhenatherum elatius*)
Gaillet gratteron (*Galium aparine*)
Géranium découpé (*Geranium dissectum*)
Géranium des Pyrénées (*Geranium pyrenaicum*)
Géranium mou (*Geranium molle*)
Gléchome lierre terrestre (*Glechoma hederacea*)
Herbe Catois (*Prunella vulgaris*)
Himantoglosse bouc (*Himantoglossum hircinum*)
Houblon lupulin (*Humulus lupulus*)
Jacobée commune (*Jacobaea vulgaris*)
Laiteron épineux (*Sonchus asper*)
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus*)
Lamier blanc (*Lamium album*)
Lamier pourpre (*Lamium purpureum*)

Lampsane commune (*Lapsana communis*)
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis*)
Luzerne d'Arabie (*Medicago arabica*)
Magnolia à grandes fleurs (*Magnolia grandiflora*)
Noisetier commun (*Corylus avellana*)
Orge sauvage (*Hordeum murinum*)
Ortie dioïque (*Urtica dioica*)
Pâquerette vivace (*Bellis perennis*)
Pariétaire de Judée (*Parietaria judaica*)
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius*)
Pâturin annuel (*Poa annua*)
Pâturin commun (*Poa trivialis*)
Petite bardane (*Arctium minus*)
Picride fausse vipérine (*Helminthotheca echioides*)
Plantain élevé (*Plantago major*)
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*)
Ptéridion aigle (*Pteridium aquilinum*)
Potentille rampante (*Potentilla reptans*)
Renoncule âcre (*Ranunculus acris*)
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare*)
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*)
Rosier des chiens (*Rosa canina*)
Séquoia toujours vert (*Sequoia sempervirens*)
Sisymbre officinal (*Sisymbrium officinale*)
Stellaire intermédiaire (*Stellaria media*)
Sureau noir (*Sambucus nigra*)
Trèfle des prés (*Trifolium pratense*)
Véronique de Perse (*Veronica persica*)
Vigne-vierge commune (*Parthenocissus inserta*)
Vulpin des prés (*Alopecurus pratensis*)

Lichen

Phaeophyscia orbicularis

Liste exhaustive des espèces rencontrées aux parc Berlioz, de la Chevrette et des Saules lors de l'inventaire éclair du 25 avril 2026 après-midi (1h sur place)

Oiseaux (12 espèces)

Corneille noire (*Corvus corone*)
Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*), en vol
Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
Merle noir (*Turdus merula*)
Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)
Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*)
Mésange charbonnière (*Parus major*)
Mésange huppée (*Lophophanes cristatus*)
Pic vert (*Picus viridis*)
Pie bavarde (*Pica pica*)
Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Reptile

Lézard des murailles (*Podarcis muralis*)



Maintenant que vous connaissez un peu mieux
ces habitants discrets, saurez-vous
les retrouver dans la ville ?



Pour mieux connaître l'incroyable biodiversité
spinassienne et profiter d'ateliers ludiques,
consultez le programme des animations
de la **Maison de la Réserve écologique** !

